

ข้อควรทราบ เกี่ยวกับการอุดฟัน

- ห้ามเคี้ยวบริเวณฟันที่อุดใหม่ (1 วัน) อาจทำให้ฟันที่อุดแตกบิ่นได้
 - กรณีฟันแตกบิ่น ควรรีบให้ทันตแพทย์แก้ไข หากไม่แก้ไขอาจทำให้ฟันผุลุกลามต่อไปได้
 - กรณีเคี้ยวหรือกัดฟันแล้วรู้สึกเสียด บริเวณฟันซี่ที่อุด ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไข
 - ฟันที่ผุมาก ไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟัน ทันตแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยการครอบฟัน หรือรักษารากฟัน กรณีที่ผุนทะลุโพรงประสาทฟัน
 - วัสดุอุดฟันมี 2 ชนิด
 1. ชนิดที่เป็นโลหะ (Amalgam) มักใช้อุดฟันกราม เพราะทนทาน สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดี
 2. ชนิดสีใกล้เคียงฟัน (Composite Resin) นิยมใช้กับฟันหน้า เพราะมีสีสวยงาม แต่ทนทานน้อยกว่าแบบโลหะ
- ** กรณีอุดด้วยวัสดุสีใกล้เคียงฟัน อาจมีอาการเสียวฟันได้ ให้รอดูอาการ 1 เดือน หากไม่หาย ควรรีบพบทันตแพทย์**

